

## PAKKAUSSELOSTE

### Tamiflu 45 mg kovat kapselit oseltamiviiri

#### **Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.**

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

#### **Tässä pakkausselosteessa esitetään:**

1. Mitä Tamiflu on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Tamifluta
3. Miten Tamifluta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Tamiflun säilyttäminen
6. Muuta tietoa

#### **1. MITÄ TAMIFLU ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN**

- Tamiflu on lääke influenssan ehkäisyyn ja hoitoon
- Tamiflu kuuluu lääkeryhmään ”neuraminidaasin estäjät”. Nämä lääkkeet estävät influenssaviruksen leviämisen kehossa ja helpottavat tai estävät näin influenssavirusinfektion aiheuttamia oireita.
- Influenssa on influenssaviruksen aiheuttama sairaus. Influenssan oireita voivat olla äkillinen korkea kuume (yli 37,8 °C), yskä, vuotava tai tukkoinen nenä, päänsärky, lihaskipu ja usein voimakas väsymys. Näitä oireita voivat aiheuttaa myös muut tulehdustaudit kuin influenssa. Influenssaa esiintyy vuosittain ainoastaan tiettyinä aikoina, jolloin influenssavirukset leviävät paikallisesti (epidemia). Epidemia-ajan ulkopuolella näitä oireita aiheuttavat pääasiassa muut infektiot tai sairaudet

#### **2. ENNEN KUIN KÄYTÄT TAMIFLUTA**

##### **Älä ota Tamifluta**

- jos olet allerginen (yliherkkä) oseltamiviirille tai Tamiflun jollekin muulle aineelle.

##### **Ole erityisen varovainen Tamiflun suhteen**

Kerro lääkärillesi ennen hoidon aloittamista, jos

- olet allerginen muille lääkkeille
- sinulla on munuaisoireita

##### **Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö**

Kerro lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Tamifluta voidaan käyttää parasetamolin, ibuprofeenin tai asetyyliisalisyylihapon (Aspirin) kanssa. Tamiflun ei oleteta muuttavan minkään toisen lääkkeen tehoa.

##### **Onko yhteisvaikutuksia influenssarokotteen kanssa?**

**Tamiflu ei korvaa influenssarokotetta.** Tamiflu ei vaikuta influenssarokotteen tehoon. Vaikka olisitkin saanut influenssarokotuksen, lääkäri voi määrätä sinulle Tamifluta.

### **Tamiflun käyttö ruuan ja juoman kanssa**

Ota Tamiflu veden kanssa aterialla tai ilman. On kuitenkin suositeltavaa ottaa Tamiflu ruuan kanssa huonovointisuuden (pahoinvointi ja oksentelu) vähentämiseksi.

### **Raskaus ja imetys**

Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana. Kerro lääkärillesi, jos olet tai luulet olevasi raskaana tai yrität tulla raskaaksi. Lääkäri voi tällöin päättää, onko sinun syytä käyttää Tamifluta.

Lääkkeen vaikutuksesta imetettävään lapseen ei ole tietoa. Kerro lääkärillesi, jos imetat. Lääkäri voi tällöin päättää, onko sinun syytä käyttää Tamifluta.

### **Ajaminen ja koneiden käyttö**

Tamiflulla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

## **3. MITEN TAMIFLUTA KÄYTETÄÄN**

Käytä Tamifluta juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Ota Tamifluta heti saatuaresi septin, koska lääke auttaa hidastamaan influenssaviruksen leviämistä elimistössäsi.

Nielaise Tamiflu-kapseli kokonaisena veden kera. Älä jaa äläkä pureskele kapselia.

Tavanomainen annos on:

#### ***Hoito***

##### **➤ Nuoret (13–17-vuotiaat) ja aikuiset:**

Aikuiset ja nuoret voivat vaihtoehtoisesti käyttää 30 mg:n ja 45 mg:n kapseleita 75 mg:n kapselin sijasta.

Ota influenssan hoitoon yksi 30 mg:n ja 45 mg:n kapseli heti reseptin saatuaresi ja sen jälkeen yksi 30 mg:n ja 45 mg:n kapseli kaksi kertaa vuorokaudessa (yleensä on miellyttävintä ottaa 30 mg:n ja 45 mg:n kapseli aamuin illoin viiden vuorokauden ajan). On tärkeää käyttää kuuri loppuun, vaikka tuntisit olosi paremmaksi jo aikaisemmin.

##### **➤ Yli 1-vuotiaat pikkulapset ja 2–12-vuotiaat lapset:** Voivat käyttää Tamiflu-oraalisuspensiota kapseleiden sijasta.

Yli 40 kg painavat lapset sekä lapset, jotka kykenevät nielemään kapseleita, voivat käyttää 75 mg:n Tamiflu-kapseleita annostuksella 1 kapseli kahdesti vuorokaudessa 5 vuorokauden ajan.

Anna lapsellesi lääkärin määräämä annos kapseleita.

Käyttöannos lasten influenssan hoidossa riippuu lapsen painosta (ks.alla oleva taulukko).

#### **1-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset:**

<b>Paino</b>	<b>Suositusannos 5 vuorokauden hoidolle</b>
Alle tai tasan 15 kg	30 mg kaksi kertaa vuorokaudessa
15 - 23 kg	45 mg kaksi kertaa vuorokaudessa
23 - 40 kg	60 mg kaksi kertaa vuorokaudessa
yli 40 kg	75 mg kaksi kertaa vuorokaudessa (75 mg saadaan yhdistämällä 30 mg:n + 45 mg:n annokset)

➤ **Alle 12 kk:n ikäiset lapset:** Alle 2-vuotiaista lapsista on saatavilla rajallinen määrä farmakokineettistä ja turvallisuustietoa. Farmakokineettistä mallinnusta on tehty käyttämällä näiden tietojen lisäksi tutkimustietoa aikuisista ja yli 1-vuotiaista lapsista. Tulokset osoittavat, että altistukset

annoksella 3 mg/kg kahdesti vuorokaudessa 3 - 12 kuukauden ikäisillä lapsilla ja 2,5 mg/kg kahdesti vuorokaudessa 1 - 3 kuukauden ikäisillä lapsilla ovat samanlaiset kuin kliinisesti on todettu tehokkaiksi aikuisilla ja yli 1-vuotiailla lapsilla (ks. alla oleva taulukon painoon perustuvat annossuosituksiset). Tällä hetkellä ei ole tietoa Tamiflun käytöstä alle 1 kuukauden ikäisillä lapsilla.

<b>Ikä</b>	<b>Suosittelun annos 5 vuorokauden hoidolle</b>
3 - 12 kuukautta	3 mg/kg kaksi kertaa vuorokaudessa
1 - 3 kuukautta	2,5 mg/kg kaksi kertaa vuorokaudessa
0 - 1 kuukautta	2 mg/kg kaksi kertaa vuorokaudessa

Tamiflun annostelun alle vuoden ikäisille lapsille on perustuttava lääkärin harkintaan hoidon mahdollisista hyödyistä ja haitoista lapselle.

### **Ehkäisy**

Tamifluta voidaan käyttää myös influenssan ehkäisyyn altistuksen jälkeen (tartunnan aiheuttaja voi olla esim. perheenjäsen).

#### ➤ Nuoret (13–17-vuotiaat) ja aikuiset:

Aikuiset ja nuoret voivat vaihtoehtoisesti käyttää 30 mg:n ja 45 mg:n kapseleita 75 mg:n kapselin sijasta. Tamiflu-annos tulee ottaa kerran vuorokaudessa 10 vuorokauden ajan. On parasta ottaa annos aamiaisen yhteydessä.

#### ➤ Yli 1-vuotiaat pikkulapset ja 2–12-vuotiaat lapset: Voivat käyttää Tamiflu-oraalisuspensiota kapseleiden sijasta.

Käyttöannos lasten influenssan ehkäisyssä riippuu lapsen painosta (ks. alla oleva taulukko).

#### 1-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset:

<b>Paino</b>	<b>Suositusannos 10 vuorokauden ehkäisylle</b>
Alle tai tasan 15 kg	30 mg kerran vuorokaudessa
15 - 23 kg	45 mg kerran vuorokaudessa
23 - 40 kg	60 mg kerran vuorokaudessa
yli 40 kg	75 mg kerran vuorokaudessa (75 mg saadaan yhdistämällä 30 mg:n + 45 mg:n annokset)

Jos lääkettä on määrätty influenssan ehkäisyyn, käytä Tamifluta niin kauan kuin lääkärisi on määrännyt.

#### ➤ Alle 12 kk:n ikäiset lapset: Pandemian aikana suositeltu ehkäisyannos alle 12 kk:n ikäisille lapsille on puolet päivittäisestä hoitoannoksesta. Tämä perustuu kliiniseen tutkimustietoon yli 1-vuotiailla lapsilla ja aikuisilla, ja osoittaa ehkäisyannoksen, vastaten puolta päivän hoitoannoksesta, olevan kliinisesti tehokas influenssan ehkäisyssä. Seuraavaa painonmukaista annostusohjetta suositellaan alle 1-vuotiaiden lasten ehkäisyyn:

<b>Ikä</b>	<b>Suosittelun annos 10 vuorokauden ehkäisylle</b>
3 - 12 kuukautta	3 mg/kg kerran vuorokaudessa
1 - 3 kuukautta	2,5 mg/kg kerran vuorokaudessa
0 - 1 kuukautta	2 mg/kg kerran vuorokaudessa

Tamiflun annostelun alle vuoden ikäisille lapsille on perustuttava lääkärin harkintaan ehkäisyn mahdollisista hyödyistä ja haitoista lapselle.

### **Kun Tamiflu-oraalisuspensiota ei ole saatavilla**

Jos kaupalliseen käyttöön tarkoitettua Tamiflu-jauhetta oraalisuspensiota varten ei ole helposti saatavilla, voivat aikuiset, nuoret ja lapset, jotka eivät kykene nielemään kapseleita, ottaa vastaavan Tamiflu-annoksen (ks. kohta 3 pakkausselosteesta) avaamalla kapselit ja kaatamalla kapseleiden

sisällön pieneen määrään makeutettua ruoka-ainetta (korkeintaan 1 teelusikallinen), esim. sokeriveteen, suklaasiirappiin, kirsikkasiirappiin, jälkiruokien kuorrutteisiin (esim. karamelli- tai kinuskikastike), lääkeaineen kitkerän maun peittämiseksi. Seosta sekoitetaan ja koko annos annetaan potilaalle. Seos on nieltävä heti valmistuksen jälkeen.

### Tamiflu-annosten valmistaminen alle 1-vuotiaalle lapselle – 45 mg:n kapselit

Alle 10 kg painavat lapset tarvitsevat Tamiflu-annokseksi 30 mg tai vähemmän. Valmistaksesi Tamiflu-annokset näille lapsille, sinun täytyy avata Tamiflu-kapseli, valmistaa jauhe-vesiseos ja sekoittaa oikea määrä seosta ruoan kanssa.

Tarvitset:

1. Yhden 45 mg:n Tamiflu-kapselin
2. Katso annostaulukosta oikea annosmäärä (ks. Tamiflu-annostaulukko seuraavan kappaleen kohdasta 3)
3. Saksset
4. Kaksi pientä astiaa per lapsi (käytä jokaiselle lapselle omia erillisiä astioita)
5. Yhden 5 ml:n (viiden millilitran) ruiskun, jossa 0,2 ml:n (kaksi kymmenesosa millilitran) mitta-asteikko
6. Yhden sopivan ruiskun, jossa 0,1 ml:n (yksi kymmenesosa millilitraa) mitta-asteikko. Pyydä apteekista oikean kokoinen ruisku (1 ml, 2 ml tai 3 ml).
7. Yhden teelusikan.
8. Jonkun seuraavista ruoka-aineista peittämään Tamiflu-jauheen kitkerää makua:
  - Sokerivettä (jos käytät sokerivettä, valmista nyt seos erillisessä astiassa tai kupissa. Sekoita teelusikallinen vettä ja kolmeneljäsosa (3/4) teelusikallista sokeria.)
  - Suklaasiirappia
  - Kirsikkasiirappia
  - Jälkiruokien kuorrutteita esim. karamelli- tai kinuskikastiketta

### 10 mg/ml Tamiflu-seoksen valmistus alle 1-vuotiaalle lapselle – 45 mg:n kapselit

Nämä ohjeet opastavat sinua valmistamaan yhden Tamiflu-annoksen heti käytettäväksi.

1. Avaa varovasti YKSI 45 mg:n Tamiflu-kapseli ensimmäisen pienen astian yllä. Avataksesi kapselin pidä kapseli pystyasennossa ja leikkaa saksilla pyöreä kärki irti (katso oikeinen kuva). Kaada kaikki jauhe astiaan. Käsittele jauhetta varoen, koska se voi ärsyttää ihoa ja silmiä.



2. Noudata alla olevan taulukon ohjeita. Käytä 5 ml ruiskua mitatessasi 4,5 ml vettä ja lisää se jauheastiaan. *Sekoita noin 2 minuuttia.*

Tamiflu-kapseli	Lisättävä vesimäärä
YKSI 45 mg:n kapseli 	4,5 ml (neljä ja puoli millilitraa)



3. Noudata alla olevan taulukon ohjeita. Katso lapsen paino taulukon vasemmasta sarakkeesta. Sen jälkeen katso taulukon oikean puoleisesta sarakkeesta ruiskuun vedettävän Tamiflu-jauhe-


vesiseoksen määrä. Vedä ensimmäisestä pienestä astiasta oikea määrä jauhe-vesiseosta ruiskuun. Tyhjennä ruisku varovasti toiseen astiaan.

Tamiflu-annostaulukko 1 -12 kuukauden ikäisille lapsille:

<b>Paino</b>	<b>Tarvittava Tamiflu-annos</b>	<b>Ruiskuun vedettävän Tamiflu-jauhe-vesiseoksen määrä</b>
4 kg	10 mg	1,00 ml
4,5 kg	11,25 mg	1,10 ml
5 kg	12,5 mg	1,30 ml
5,5 kg	13,75 mg	1,40 ml
6 kg	15 mg	1,50 ml
7 kg	21 mg	2,10 ml
8 kg	24 mg	2,40 ml
9 kg	27 mg	2,70 ml
Yli 10 kg	30 mg	3,00 ml

Tamiflu-annostaulukko alle 1 kuukauden ikäisille lapsille:

<b>Paino (pyöristetään lähimpään 0,5 kg:aan)</b>	<b>Tarvittava Tamiflu-annos</b>	<b>Ruiskuun vedettävän Tamiflu-jauhe-vesiseoksen määrä</b>
3 kg	6 mg	0,60 ml
3,5 kg	7 mg	0,70 ml
4 kg	8 mg	0,80 ml
4,5 kg	9 mg	0,90 ml



4. Lisää toiseen astiaan pieni määrä makeutettua ruokaa (korkeintaan 1 teelusikallinen). Sepeittää jauhe-vesiseoksen kitkerän maun.



5. Sekoita makea ruoka ja jauhe-vesiseos hyvin.



6. Anna toisen astian koko sisältö (makea ruoka, jossa jauhe-vesiseos) lapselle.  
 7. Anna lapselle jotain sopivaa juotavaa.  
 8. Hävitä ensimmäiseen astiaan jäljelle jäänyt käyttämätön jauhe-vesiseos.

(Huom! Kapselin sisältö ei ehkä liukene täysin. Älä huolestu, sillä liukenemattomat aineet ovat tehottomia apuaineita.)

### **Jos otat enemmän Tamifluta kuin sinun pitäisi**

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.

### **Jos unohtat ottaa Tamiflun**

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kapselin.

### **Jos lopetat Tamiflun käytön**

Tamiflu-hoidon lopettaminen aikaisemmin kuin lääkäri on määrännyt ei aiheuta haittavaikutuksia. Influenssan oireita saattaa kuitenkin ilmaantua uudelleen, jos olet lopettanut Tamiflu-hoidon aikaisemmin.

Jos Sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

## **4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET**

Kuten kaikki lääkkeet, Tamiflugin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

### **- Tamiflun yleiset haittavaikutukset**

Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat pahoinvointi, oksentelu, ripuli, vatsakipu ja päänsärky. Näitä oireita havaitaan yleensä ainoastaan ensimmäisen annoksen jälkeen ja ne tavallisesti loppuvat hoitoa jatkettaessa. Ottamalla lääkevalmiste ruuan yhteydessä haittavaikutukset vähenevät.

### **- Tamiflun harvinaiset haittavaikutukset**

#### **Aikuiset ja nuoret (yli 13-vuotiaat)**

Muita harvinaisempia haittavaikutuksia, jotka voivat johtua myös influenssasta, ovat ylävatsan täysinäisyyden tunne, ruoansulatuskanavan verenvuoto, keuhkoputkentulehdus, ylähengitysteiden tulehdus, huimaus, väsymys, univaikeudet, ihoreaktioita, lieviä tai vakavia maksan toimintahäiriöitä, näköhäiriöitä ja sydämen rytmihäiriöitä.

Influenssaan voi liittyä hermostollisia ja käyttäytymiseen vaikuttavia oireita mm. aistiharhoja, sekavuustiloja sekä epänormaalia käytöstä, mitkä ovat joissain tapauksissa johtaneet kuolemaan. Näitä tapahtumia voi esiintyä aivotulehduksen tai aivosairauden aikana mutta niitä voi esiintyä myös ilman selvää vakavaa sairautta.

Tamiflu-hoidon aikana on havaittu kouristuksia ja sekavuustiloja (mm. tajunnan tason muutos, sekavuus, epänormaali käytös, harhakuvitelmat, sekavuustilat, kiihtymys, levottomuus sekä painajaiset). Ne ovat erittäin harvoin johtaneet tapaturmaiseen loukkaantumiseen tai joissain tapauksissa kuolemaan. Näitä tapahtumia on raportoitu ensisijaisesti lapsilla ja nuorilla, ja ne ovat usein alkaneet äkillisesti sekä lievittyneet nopeasti. Tamiflun osuutta tapahtumiin ei tiedetä. Samanlaisia neuropsykiatrisia tapahtumia on raportoitu myös potilailla, jotka eivät ole käyttäneet Tamifluta.

#### **Lapset (1 - 12 -vuotiaat)**

Muita harvinaisempia haittavaikutuksia, jotka voivat myös olla influenssan aiheuttamia, ovat korvatulehdus, keuhkojen tulehdus, sivuontelotulehdus, keuhkoputkentulehdus, olemassa olevan astman paheneminen, nenäverenvuoto, korvasairaudet, ihotulehdus, imusolmukkeiden turvotus, sidekalvotulehdus, näköhäiriöitä ja sydämen rytmihäiriöitä.

### **Lapset (6 - 12 kuukautta)**

Tamiflu-hoidon aikana raportoidut haittavaikutukset 6 - 12 kuukauden ikäisillä influenssaa sairastavilla lapsilla ovat samanlaisia kuin vanhemmilla lapsilla (1-vuotiaat tai tätä vanhemmat) raportoidut. Lisätietoa on yllä olevassa kappaleessa.

### **Lapset (0 - 6 kuukautta)**

Tamiflu-hoidon aikana raportoidut haittavaikutukset 1 - 6 kuukauden ikäisillä influenssaa sairastavilla lapsilla ovat samanlaisia kuin 6 - 12 kuukauden ikäisillä ja vanhemmilla lapsilla (1-vuotiaat tai tätä vanhemmat) raportoidut. Lisätietoa on yllä olevassa kappaleessa.

***Jos sinä tai lapsesi olette usein sairaana, ota yhteys lääkäriisi. Kerro myös lääkärillesi, mikäli influenssaoireet pahenevat tai kuume jatkuu.***

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

## **5. TAMIFLUN SÄILYTTÄMINEN**

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä Tamifluta ulkopakkauksessa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

## **6. MUUTA TIETOA**

### **Mitä Tamiflu sisältää**

- Vaikuttava aine on oseltamiviirifosfaatti (45 mg oseltamiviiria jokaisessa kovassa kapselissa).
- Muut aineet ovat:  
kapselin sisältö: esigelatinoitu tärkkelys, talkki, povidoni, kroskarmelloosinatrium ja natriumstearyylifumaraatti  
kapselikuori: liivate, musta rautaoksidi (E172) sekä titaanidioksidi (E171)  
painomuste: shellakka (E904), titaanidioksidi (E171) ja FD ja C Blue2 (indigokarmiini, E132).

### **Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)**

45 mg kova kapseli koostuu harmaasta himmeästä pohjaosasta, jossa merkintä "ROCHE", sekä harmaasta himmeästä kansiosasta, jossa merkintä "45 mg". Merkinnät ovat sinisiä.

Tamiflu 45 mg:n kovia kapseleita on saatavana 10 kapselin läpipainopakkauksissa.

### **Myyntiluvan haltija ja valmistaja**

Roche Registration Limited  
6 Falcon Way  
Shire Park  
Welwyn Garden City  
AL7 1TW  
Iso-Britannia

Roche Pharma AG  
Emil-Barell-Str. 1  
79639 Grenzach-Wyhlen  
Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

**België/Belgique/Belgien**

N.V. Roche S.A.  
Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

**Luxembourg/Luxemburg**

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

**България**

Рош България ЕООД  
Тел: +359 2 818 44 44

**Magyarország**

Roche (Magyarország) Kft.  
Tel: +36 - 23 446 800

**Česká republika**

Roche s. r. o.  
Tel: +420 - 2 20382111

**Malta**

(See United Kingdom)

**Danmark**

Roche a/s  
Tlf: +45 - 36 39 99 99

**Nederland**

Roche Nederland B.V.  
Tel: +31 (0) 348 438050

**Deutschland**

Roche Pharma AG  
Tel: +49 (0) 7624 140

**Norge**

Roche Norge AS  
Tlf: +47 - 22 78 90 00

**Eesti**

Roche Eesti OÜ  
Tel: + 372 - 6 177 380

**Österreich**

Roche Austria GmbH  
Tel: +43 (0) 1 27739

**Ελλάδα**

Roche (Hellas) A.E.  
Τηλ: +30 210 61 66 100

**Polska**

Roche Polska Sp.z o.o.  
Tel: +48 - 22 345 18 88

**España**

Roche Farma S.A.  
Tel: +34 - 91 324 81 00

**Portugal**

Roche Farmacêutica Química, Lda  
Tel: +351 - 21 425 70 00

**France**

Roche  
Tél: +33 (0) 1 46 40 50 00

**România**

Roche România S.R.L.  
Tel: +40 21 206 47 01

**Ireland**

Roche Products (Ireland) Ltd.  
Tel: +353 (0) 1 469 0700

**Slovenija**

Roche farmacevtska družba d.o.o.  
Tel: +386 - 1 360 26 00

**Ísland**

Roche a/s  
c/o Icepharma hf  
Sími: +354 540 8000

**Slovenská republika**

Roche Slovensko, s.r.o.  
Tel: +421 - 2 52638201

**Italia**

Roche S.p.A.  
Tel: +39 - 039 2471

**Suomi/Finland**

Roche Oy  
Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

**Κύπρος**

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.  
Τηλ: +357 - 22 76 62 76

**Latvija**

Roche Latvija SIA  
Tel: +371 - 6 7039831

**Lietuva**

UAB "Roche Lietuva"  
Tel: +370 5 2546799

**Sverige**

Roche AB  
Tel: +46 (0) 8 726 1200

**United Kingdom**

Roche Products Ltd.  
Tel: +44 (0) 1707 366000

**Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi {pvm}**

23.10.2009

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston (EMA) kotisivuilta  
<http://www.emea.europa.eu/>.